

Doporučení k užívání IVERMECTINU a FENBENDAZOLU - 68letá žena z ČESKÉ REPUBLIKY s rakovinou plic ve 4. stádiu s metastázami do kostí po 10 měsících hlásí 50% regresi plicního nádoru a metastáz



KLÍČOVÝ BOD:

68letá žena v ČESKÉ REPUBLICE s rakovinou plic ve 4. stádiu s metastázami do kostí

V dubnu 2025 začala užívat ivermektin a fenbendazol 888 mg/den.

V září 2025 CT vyšetření ukázalo progresi.

V říjnu 2025 provedla 2 změny:

1. Zdvojnásobení dávky fenbendazolu na 1776 mg/den
2. Onkolog zahájil léčbu přípravkem Lumikras (konkrétně se zaměřuje na mutaci KRAS G12C, aby inhiboval růst nádoru).

Výsledky po 3 měsících: více než 50% regrese plicního nádoru a metastáz.

Komentář:

Dávkování je důležité a důležitá je i kombinovaná léčba.



Dobrý den,

chtěl/a bych vám poděkovat. Mám dobré zprávy. Podle výsledků CT vyšetření došlo u mé maminky k více než 50% regresi nádoru plic a metastáz.

Výrazné zlepšení začalo v říjnu, kdy jí onkolog předepsal přípravek Lumykras. Užívá 96 mg ivermektinu, 1 776 mg fenbendazolu a Lumykras (má mutaci KRAS...). Tato kombinace vedla k rychlejší regresi nádoru.

Chtěl/a bych se zeptat, zda je možné léčbu ivermektinem a fenbendazolem na týden přerušit. Myslel/a jsem, že by tato přestávka mohla znovu podpořit účinnost užívaných látek. Ivermektin a fenbendazol užívá téměř deset měsíců. Je taková přestávka v pořádku?

Prosím, přepošlete tento e-mail [jméno skryto]. Moje maminka je pravděpodobně jeho první pacientkou v České republice.

Děkuji vám,s vděčností

[jméno skryto]

Česká republika

Vždy je důležité se přizpůsobit, abyste zjistili, co funguje.

NOVÁ FLORIDSKÁ ONKOLOGICKÁ KLINIKA BRZY!!

E-mail: info@makisw.com

<http://x.com/MakisMedicine>

<https://www.instagram.com/wmakismedicine/>

Není na Facebooku, Telegramu, Signalu, TikToku, WhatsAppu, Messengeru, žádných webových stránkách

ŽÁDNÉ WEBOVÉ STRÁNKY (Jakákoli webová stránka s mou fotografií je podvodná a existují jich stovky)

Prosím, nezapojte se do žádného ze stovek podvodníků.